Prevenција kardiovaskularnih oboljenja

Aneta Bošković¹,

¹Klinički centar Crne Gore

Klinika za kardiologiju

Univerzitet Crne Gore, Medicinski fakultet-Podgorica

Kontakt Autor: Aneta Bošković Adresa: Ljubljanska bb, 20000 Podgorica E-mail: ranko@t-com.me

Sažetak

Kardiovaskularne bolesti u prosjeku skraćuju životni vijek za 10 godina. I dalje zauzimaju prvo mjesto u ukupnom mortalitetu. Prema rezultatima istraživanja tokom posljednje dekade, broj oboljelih od kardiovaskularnih bolesti (KVB) će i dalje rasti, uglavnom na račun porasta gojaznosti i broja oboljelih od diabetes mellitusa. U prevenciji KVB-a se insistira na ispitivanju prisustva svih faktora rizika, jer oni potenciraju jedan drugog i znatno povećavaju rizik za pojavu KVB-a. Populaciona i visokorizična preventivna strategija treba da budu komplementarne; primjena mjera prevencije samo kod visokorizičnih osoba je manje efikasna, potrebni su edukacioni programi za cijelu populaciju.

Cilj treba da bude redukcija rizika za pojavu KVB-a; ako cilj ne može biti postignut uticajem na jedan faktor rizika, rizik se još može redukovati intenzivnijim djelovanjem na druge faktore rizika. Uvijek treba imati na umu promjenu stila života i životnih navika bez kojih nema adekvatne prevencije od KVB-a, bez obzira na primjenu različitih lijekova.

Prevention of cardiovascular diseases

Abstract

Cardiovascular diseases (CVD) shorten average human life for 10 years. In total mortality rate they occupy the top of the list. According to the researches during the last decade, number of patients with CVD will continue to increase mainly due to obesity raise and increase in number of patients suffering from diabetes mellitus. At the same time in CVD prevention presence of all risk factors is taken into consideration since they potentiate one another and significantly increase risk for CV event. Population and high-risk preventive strategies should be complementary; an approach limited to high-risk persons will be less effective; population education programs are still needed.

In both strategies, the goal is reduction of risk for occurrence of fatal CVD event. If the goal cannot be reached by reduction of one risk factor, risk for fatal CVD can be reduced by acting upon other risk factors more intensively. We should always consider modification of lifestyle since there is no adequate CVD prevention without it regardless application of various medicines

Key words: Atherosclerosis, Preventive Health Service, Risk, Cardiovascular disease

Epidemiologija kardiovaskularnih oboljenja

Godinama je poznato da u svijetu vlada epidemija kardiovaskularnih bolesti (KVB), a među njima svakako prvo mjesto zauzima koronarna bolest. Davne 1900. godine kardiovaskularni mortalitet je iznosio manje od 10% ukupnog mortaliteta, 1970. godine kardiovaskularne bolesti su bile vodeći uzrok smrti u razvijenim zemljama. Potom slijedi pad mortaliteta u razvijenim zemljama, a brz porast u zemljama u razvoju. Godine 2000-te je 15 miliona ljudi umrlo od

kardiovaskularnih bolesti i one su vodeći uzrok smrti širom svijeta. Danas 19 miliona ljudi umire od KVB-a, a smatra se da će 2020. godine 25 miliona ljudi umrijeti usljed KVB-a (1,2,3,4). Prema izvještaju Američkog instituta za statistiku, ukoliko bismo uspjeli da isključimo sva kardiovaskularna oboljenja, prosječni životni vijek bi se produžio za 10 godina, a ukoliko bismo isključili sva maligna oboljenja za samo 3 godine (5).

Aterotromboza skraćuje očekivani životni vijek prosječno 8–12 godina u bolesnika starijih od 60 godina¹

Prosječni očekivani životni vijek kod 60-godišnjaka (muškarci)

1. Peeters et al. *Eur Heart J* 2002;
23: 458–466

Analiza podataka iz Framingham
Heart Study

Slika br. 1. Uticaj kardiovaskularnih bolesti na životni vijek

KVB su vodeći uzrok smrti i invalidnosti u Evropi – 4.35 miliona. Više žena umire od KVB-a – 2.3 miliona žena; 2 miliona muškaraca. Postoji desetostruka regionalna razlika u morbiditetu i mortalitetu usljed KVB-a u Evropi sa smanjenjem u zemljama zapada. U Evropi, KVB je odgovoran za 42% smrtnih ishoda u žena mlađih od 75 godina i za 38% smrtnih ishoda u muškaraca mlađih od 75 godina (6). U Crnoj Gori za 2008.godinu KVB mortalitet je iznosio 54% (7). Generalno je slaba kontrola faktora rizika. Poboljšanja koja su postignuta u odnosu na pušenje, kontrolu arterijskog krvnog pritiska i lipida u serumu, su umanjena smanjenom fizičkom aktivnošću, porastom gojaznosti i posljedičnim diabetes mellitusom (1,2,9).

Pacijenti koji imaju simptome koronarne bolesti i drugih aterosklerotičnih oboljenja, smatraju se za osobe sa vrlo visokim rizikom za pojavu novog kardiovaskularnog događaja. Kod onih koji su liječeni od akutnog infarkta miokarda (AIM), postoji od 5 do 7 puta veći rizik za pojavu ponovnog infarkta miokarda i od 3 do 4 puta veći rizik za pojavu cerebrovaskularnog insulta (CVI). Kod onih koji su liječeni od CVI postoji od 2 do 3 puta veći rizik za pojavu AIM i 9 puta veći rizik za pojavu novog CVI (10).

Analiza podataka Framingham Heart Study je urađena da bi se odredio uticaj KVB-a na životni vijek. U studiji su sakupljeni podaci za 5070 osoba tokom 40 godina praćenja, koje u početku nijesu imale neku od kardiovaskularnih bolesti (koronarna bolest, cerebrovaskularna bolest, kongestivna srčana insuficijencija, periferna arterijska bolest). Prema ovoj analizi, više od 60% muškaraca i žena starijih od 40 godina će imati KVB u nekoj dobi tokom svog života. Kod osoba starijih od 60 godina, pojava KVB-a u čijoj osnovi je arterotromboza, skraćuje životni vijek za 8 do 12 godina, slika br. 1, (11).

Stoga se danas u kardiologiji izrazito veliki značaj pridaje prevenciji KVB-a utičući na smanjenje faktora rizika za njihovu pojavu. Da je prevencija uspješna pokazuju analize, prema kojima je više od 50% smanjenja KVB-a mortaliteta nastalo usljed promjene faktora rizika, a 40% zbog poboljšanja terapije (12).

Rizik za pojavu fatalnog kardiovaskularnog događaja

U prevenciji KVB-a se insistira na ispitivanju prisustva svih faktora rizika, jer oni potenciraju jedan drugog i znatno povećavaju rizik za pojavu koronarne bolesti i drugih KVB. Prisustvo više faktora rizika obično doprinosi arterosklerozi, koja uzrokuje KVB. Pošto proces ateroskleroze počinje u ranom djetinjstvu, mjere prevencije treba sprovoditi tokom cijelog života, od rođenja (ako ne i ranije) do kraja života.

Prema tome, cilj treba da bude redukcija rizika za pojavu KVB-a; ako cilj ne može biti postignut uticajem na jedan faktor rizika, rizik se još može redukovati intenzivnijim djelovanjem na druge faktore rizika (13). Možemo uticati na hiperholesterolemiju, arterijsku hipertenziju, pušenje, gojaznost, fizičku neaktivnost i diabetes mellitus, za razliku od pola, životne dobi, pozitivne porodične anamneze za koronarnu bolest i ranijih koronarnih događaja na koje nemamo uticaja.

Osobe sa već poznatim KVB-om, diabetes mellitusom tipa 2 i diabetes mellitusom tipa 1 sa mikroalbuminurijom, umjerenom ili ozbiljnom renalnom insuficijencijom i osobe sa veoma visokim nivoom individualnih faktora rizika su već sa povećanim rizikom za KVB i zahtijevaju tretman za sve faktore rizika. Za sve ostale se može koristiti tablica SCORE rizika za procjenu KVB rizika (11). SCORE sistem procjenjuje 10-godišnji rizik za fatalni KVB događaj-aterosklerotski, kao što su akutni infarkt miokarda, cerebrovaskularni insult, aneurizma aorte ili drugi. Tablice SCORE sistema su date u preporukama Evropskog udruženja kardiologa-European Society of Cardiology (ESC) za prevenciju KVB-a, slika br. 2. Ovo je od posebnog značaja jer mnoge osobe imaju umjereno povišene nivoe nekoliko faktora rizika, koji u kombinaciji mogu dovesti do neočekivano visokog nivoa rizika za KVB. Procjena rizika uz pomoć SCORE sistema (uz uključene vrijednosti HDL holesterola, od 2012. god.) pomaže u donošenju odluka u vezi sa terapijom i može pomoći da se izbjegne kako nedovoljna, tako i prekomjerna terapija.

Iako bi idealno bilo da sve odrasle osobe imaju procijenjen rizik za KVB, to nije praktično za mnoga društva. Odluka se mora donijeti na nivou svake države, što zavisi od resursa. Preporučuje se skrining faktora rizika, uključujući i lipidni profil, kod muškaraca iznad 40. godine života i žena iznad 50. godine ili poslije menopauze (10). Procjenu rizika treba raditi ako tokom konsultacije osoba to traži; ako ima jedan ili više faktora rizika za KVB; ako postoji pozitivna porodična anamneza za rani KVB ili veliki faktor rizika kao što je hiperlipidemija; iako ima simptome koji upućuju na KVB.

Slika br. 2. SCORE tablice za izračunavanje 10-godišnjeg rizika za pojavu fatalnog KVB-a

Pored već poznatih glavnih faktora rizika za pojavu KVB-a, mnoge studije su pokazale da osobe sa niskim socioekonomskim statusom imaju veći rizik za ukupni mortalitet, pa i za KVB mortalitet. Pored toga depresija, anksioznost, kao i tip D ličnosti povećavaju rizik od KVB-a i pogoršavaju njegovu prognozu (12).

Novi biomarkeri imaju limitiranu vrijednost kad se dodaju procjeni rizika sa SCORE sistemom. Visokosenzitivni C reaktivni protein (hs CRP) i homocistein mogu se koristiti kod osoba sa umjerenim KVB rizikom (12).

Prevenција kardiovaskularnih obolenja

Izveštaj Svjetske zdravstvene organizacije za prevenciju KVB-a definiše tri komponente preventivne strategije

- populacija
- visok rizik
- sekundarna prevencija

Ove tri strategije treba da budu komplementarne, a ne kompetitivne. Primijećen je preventcioni paradoks: osobe sa visokim rizikom najviše dobijaju sa preventivnim mjerama, ali najviše smrti od KVB-a upravo je u grupi sa niskim i umjerenim rizikom jer su najbrojniji, slika br. 3, (2). Populaciona strategija (mjere koje se primjenjuju u opštoj populaciji), iako izgleda da daje malu korist za pojedinca, donosi veliki benefit u populaciji, jer se najveći broj KVB događaja dešava u grupi pacijenata sa umjerenim rizikom. Mada strategije i mjere koje se primjenjuju kod visokorizičnih pacijenata (osobe bez KVB, ali sa vrlo visokim KVB rizikom ili one sa već prisutnim KVB-om) pojedincu donose značajan benefit, njihov uticaj na populaciju je ograničen, zato što je visokorizičnih osoba malo u populaciji. Uočeno je da se najveći preventivni efekat dobija kada se ove dvije strategije kombinuju.

Slika br. 3. Očekivani broj kardiovaskularnih smrti prema predviđenom riziku

Prevenzioni paradoks – Ilustracija činjenice da se većina događaja dešava u niskorizičnih osoba sa malo smrti među visokorizičnim osobama.

Promocija i edukacija, u smislu zdravog stila života kod mladih osoba, je ključna (prestanak pušenja, zdrava ishrana, fizička aktivnost) i mjere prevencije za KVB treba sprovoditi doživotno. Prema preporukama Evropskog udruženja kardiologa za prevenciju KVB-a, moglo bi se reći da postoji šifra »BITI ZDRAV I OSTATI ZDRAV« koja se odnosi na kardiovaskularna oboljenja i glasi »0 3 5 140 5 3 0«, što znači:

0	bez duvana
3	šetnja 3km ili 30 minuta umjerene fizičke aktivnosti
dnevno	
5	porcija voća i povrća dnevno
140	krvni pritisak da bude < 140/90 mmHg
5	ukupni holesterol < 5 mmol/l
3	LDL holesterol < 3 mmol/l
0	izbjegavati prekomjernu tjelesnu težinu, diabetes mellitus i stres

Prioriteti u prevenciji KVB-a u kliničkoj praksi su:

- Pacijenti sa utvrđenom arterosklerotskim KVB-om;
- Asimptomatske osobe koje su sa povećanim rizikom za kardiovaskularno oboljenje zbog:
  - multiplih faktora rizika koji povećavaju ukupni rizik od KVB ($\geq 5\%$ 10-godišnji rizik za smrt usljed KVB-a);
  - diabetes mellitusa tipa 2 i diabetes mellitusa tipa 1 sa mikroalbuminurijom;
  - ozbiljno hronično bubrežno oboljenje (GFR $< 30\text{ml/min/1,73m}^2$);
  - značajno povišen jedan faktor rizika, posebno ako je udružen sa oštećenjem organa.
- Bliski rođaci osoba sa ranim arterosklerotskim KVB-om ili oni sa visokim rizikom.

Ciljevi prevencije KVB-a su:

- Pomoći onima sa niskim rizikom da održe što duže takvo stanje i pomoći onima sa povećanim ukupnim rizikom za KVB da ga redukuju;
- Postizanje osobina ljudi koji namjeravaju da ostanu zdravi:

- bez pušenja;
- izbor zdrave hrane;
- 30 minuta umjerene fizičke aktivnosti dnevno;
- BMI < 25 kg/m² i da nema centralne - abdominalne gojaznosti (obim struka < 80 cm kod žena i < 94 cm kod muškaraca);
- TA < 140/90 mmHg;
- ukupni kolesterol < 5 mmol/l;
- LDL kolesterol < 3 mmol/l;
- glikemija < 6 mmol/l.
- Uspostaviti strogu kontrolu faktora rizika kod visokorizičnih osoba, posebno u onih sa utvrđenim KVB-om ili diabetes mellitusom:
  - TA < 140/80 mmHg ako je ostvarivo;
  - LDL kolesterol < 1.8 mmol/l ako je ostvarivo, ili smanjenje LDL hol za ≥ 50% od početne vrijednosti ako nije moguće ostvariti ciljnu vrijednost;
  - glikemija natašte < 6 mmol/l i HbA1c < 7%.
- Razmotriti kardioprotektivnu terapiju kod osoba sa visokim rizikom, posebno onih sa utvrđenim aterosklerotskim KVB-om.

Redukcija ukupnog rizika počinje promjenama životnih navika. To zavisi od spremnosti pacijenata sa KVB-om da modifikuju svoje ponašanje. Kada se razviju simptomi koronarne bolesti ili druge kardiovaskularne bolesti, mnogi pacijenti bi trebalo da sprovedu promjene životnih navika uz stručnu podršku i podršku porodice. Neophodno je prestati sa pušenjem, pridržavati se dijetalne ishrane u smislu smanjenja tjelesne težine, ukoliko je potrebno i smanjenja holesterola, tabela br. 1. Ciljevi dijeta su da se smanji ukupna količina unesenih masti na 30% od ukupnog energetskeg unosa, unos zasićenih masti ne bi trebalo da prelazi 10% ukupnog energetskeg unosa, a unos holesterola mora biti manji od 300mg dnevno. Postići smanjenje unosa zasićenih masnih

kiselina, zamjenjujući ih sa mono i polinezasićenim masnim kiselinama. Povećati unos svježeg voća i povrća, kao i žitarica, ribu konzumirati 2 puta sedmično, od čega jednom ribu sa većim sadržajem masnoće. Smanjiti ukupan unos kalorija kada je potrebno smanjenje tjelesne težine. Smanjiti upotrebu soli (<5g/dan) i alkohola (do 2 čaše/dan za muškarca i 1 čaša/dan za ženu), naročito kada je krvni pritisak povišen. Adekvatne dijetetske izmjene mogu imati povoljan uticaj na više faktora rizika za pojavu KVB-a i smanjiti potrebu za medikamentoznom terapijom. Treba istaći značaj redovne fizičke aktivnosti (šetnja, plivanje, vožnja bicikla – barem 30 minuta dnevno). Fizička aktivnost pomaže u smanjenju prekomjerne tjelesne težine, povećava HDL kolesterol, smanjuje trigliceride i sklonost ka trombozi (2,14,15).

Povećana tjelesna težina je udružena sa povećanim rizikom za KVB morbiditet i mortalitet, djelujući preko povećanja krvnog pritiska, dislipidemije, smanjenja HDL holesterola i povećanja rizika za nastanak diabetes mellitusa. Preporučuje se smanjenje tjelesne težine kod gojaznih i onih sa viškom kilograma (BMI>25kg/m²), što je udruženo sa povoljnim uticajem na krvni pritisak i dislipidemiju, i sve zajedno vodi ka smanjenju rizika za KVB (16,17,18,19). BMI treba održavati u granicama 20-25 kg/m² i imati na umu da je i pothranjenost (BMI<18,5 kg/m²) udružena sa povećanim rizikom za KVB (19). Nastojati da obim struka kod muškaraca ne prelazi 94 cm, a kod žena 80 cm, da bi se izbjegla centralna gojaznost, koja je direktno povezana sa KVB-om. Redukcija kalorijskog unosa i redovna fizička aktivnost su osnov kontrole tjelesne težine. Izgleda da poboljšanje metabolizma masti nastupa sa vježbanjem prije nego što dođe do smanjenja tjelesne težine.

Pušenje je snažan i nezavisan faktor rizika i za prvi i za ponovni KV događaj, kao i za brojne druge bolesti, a rizik se uveliko povećava u kombinaciji sa drugim faktorima rizika. Pasivno pušenje takođe povećava rizik za KVB. Oni koji prestanu da puše nakon KV događaja imaju upola manji mortalitet od onih koji nastave da puše; nijedan lijek u sekundarnoj prevenciji nije toliko efikasan.

Zasićene masne kiseline da čine <10% ukupnog energetskeg unosa, zamijeniti ih sa polinezasićenim masnim kiselinama
Transnezasićene masne kiseline (nastaju hidrogenizacijom biljnih ulja-margarin) što je manje moguće, da čine < 1% ukupnog energetskeg unosa iz prirodnih izvora
< 5g soli dnevno
30-45g vlakana u toku dana, iz integralnih žitarica, voća i povrća
200g voća dnevno (2-3 obroka)
200g povrća dnevno (2-3 obroka)
Riba najmanje 2 puta sedmično, od čega jednom da bude masna riba
Konzumiranje alkoholnih pića treba ograničiti na 2 čaše dnevno (20 g alkohola dnevno) za muškarce i 1 čašu (10 g alkohola dnevno) za žene

Tabela br. 1. Preporuke Evropskog udruženja kardiologa za prevenciju KVB-a koje se odnose na ishranu – The Fifth Joint Task Force 2012 (JTF5)

Među hipolipemicima na smanjenje morbiditeta i mortaliteta od koronarne bolesti kao i drugih kardiovaskularnih bolesti, kako u primarnoj, tako i u sekundarnoj prevenciji najveću efikasnost, kao i sigurnost, u nizu studija pokazali su statini (20,21,22,23,24,25,26,27,28). Oni predstavljaju napredak u terapiji hiperholesterolemije zbog povećane efikasnosti, dobre tolerancije i lake primjene i zbog toga se najčešće upotrebljavaju kao lijekovi prve linije. Sa smanjenjem nivoa LDL holesterola u serumu smanjuje se i stopa koronarnih događaja, što je pokazano u nizu studija sa statinima u primarnoj i sekundarnoj prevenciji. Pozitivan uticaj statina uključuje i "nelipidne" mehanizme koji modifikuju endotelnu funkciju, inflamatorni odgovor, stabilnost plaka i formiranje tromba. Mnogi preporučuju terapiju statinima kod osoba sa kardiovaskularnim oboljenjima i većine dijabetičara, bez obzira na bazalne vrijednosti lipida u serumu.

LDL holesterol je primarni cilj terapije za smanjenje lipida u serumu. Drugi cilj terapije su ukupni holesterol (ukoliko se ne mogu odrediti lipidne frakcije) i visoki trigliceridi. Mada potencijalni benefit terapije koja doprinosi porastu HDL holesterola privlači pažnju, sadašnji rezultati kontrolisanih studija za smanjenje rizika nijesu dovoljni za postavljanje ciljne vrijednosti za porast HDL holesterola. Grupa lijekova koji umjereno povećavaju HDL holesterol su fibrati, a među njima fenofibrat se pokazao da ne interferira sa katabolizmom statina, prema tome ne povećava rizik za pojavu miopatije (rabdomiolize) kod bolesnika koji su već na terapiji umjerenim dozama statina (29). Druga vrsta lijeka koji povećava HDL holesterol je nikotinska kiselina, koju većina bolesnika toleriše; manje njih zbog različitih neželjenih dejstava nije u mogućnosti da uzima ovaj lijek.

Promjena načina života ostaje i dalje esencijalni modalitet u kliničkom tretmanu hiperlipidemije kako prema evropskim, tako i prema američkim preporukama. Skorašnje studije sa statinima (HPS, PROSPER, ALLHAT-LLT, ASCOT-LLA i PROVE IT-TIMI 22) su potvrdile benefit terapije za smanjenje holesterola u visokorizičnih bolesnika i podržali ESC preporuke i National Cholesterol Education Program - Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III) terapijske ciljeve za LDL holesterol. Rezultati studija su podržali uključivanje bolesnika sa diabetes mellitusom u kategoriju visokorizičnih i potvrdili benefit terapije za smanjenje LDL holesterola kod ovih bolesnika. Osim toga, potvrđeno je da i starije osobe imaju benefit od

terapijskog sniženja LDL holesterola (30). Kada visokorizični pacijenti imaju visoke trigliceride ili nizak HDL holesterol, treba razmotriti upotrebu kombinovane terapije fibratima ili nikotinskom kiselinom sa lijekovima za smanjenje LDL holesterola. Za osobe sa niskim i umjerenim rizikom, prema ESC preporukama, ciljna vrijednost LDL holesterola je $< 3,0$ mmol/l, a ukupnog holesterola $< 5,0$ mmol/l (2,9).

I pored dokazane efikasnosti i sigurnosti statina, i dalje postoje dileme. Danas se razmišlja da li su preporučene ciljne vrijednosti za LDL holesterol za koronarne bolesnike adekvatne, da li ih smanjivati još više. Upravo su tokom 2012. godine objavljene Pete preporuke Evropskog udruženja kardiologa za prevenciju kardiovaskularnih oboljenja - The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (JTF5). Prema ovim preporukama, koronarni i drugi pacijenti sa vrlo visokim rizikom (DM tip II stariji od 40 godina sa jednim ili više faktora rizika ili oštećenjem ciljnih organa, DM tip I sa oštećenjem ciljnih organa, umjerena ili ozbiljna hronična bubrežna bolest i SCORE rizik $> 10\%$) treba da teže da imaju LDL holesterol manji od $1,8$ mmol/l, ili smanjenje LDL holesterola za $\geq 50\%$ od početnih vrijednosti, ukoliko ciljne vrijednosti ne mogu biti postignute. Kod visokorizičnih pacijenata (SCORE rizik 5-10%, izrazito povećan jedan faktor rizika, DM tip II bez oštećenja ciljnih organa i drugih faktora rizika) ciljni LDL holesterol treba da bude $< 2,5$ mmol/l. Neki preporučuju upotrebu statina za sve koronarne bolesnike i većinu dijabetičara, bez obzira na nivo ukupnog holesterola i LDL holesterola u serumu (2,12,15,31).

Dileme postoje i po pitanju lipidnih frakcija koje se uzimaju kao referentne. PROCAM studija je pokazala da su povišeni trigliceridi i snižen HDL holesterol nezavisni faktori rizika za pojavu koronarne bolesti-odnosno infarkta miokarda, u odnosu na LDL holesterol (32). Prema preporukama Evropskog udruženja kardiologa za prevenciju koronarne bolesti, nivo triglicerida u serumu našte veći od $1,7$ mmol/l i nivo HDL holesterola u serumu manji od $1,0$ mmol/l za muškarce i manji od $1,2$ mmol/l za žene su markeri povećanog rizika za pojavu koronarne bolesti. Preporučuje se korišćenje HDL holesterola za procjenu rizika (2,32,33). Međutim, prema ESC preporukama, HDL holesterol se još uvijek ne preporučuje kao cilj za terapiju, tabela br. 2.

Preporuke	Klasa	Nivo	Stepen*
Preporučena ciljna vrijednost za ukupni kolesterol je <5 mmol/l, a za LDL kolesterol <3 mmol/l za osobe sa niskim ili umjerenim rizikom	I	A	jak
Kod pacijenata sa visokim rizikom ciljna vrijednost za LDL kolesterol je <2,5 mmol/l	I	A	jak
Kod pacijenata sa vrlo visokim rizikom ciljna vrijednost za LDL kolesterol je <1,8 mmol/l ili smanjenje LDL kolesterola za ≥50% od početnih vrijednosti, ako se ciljna vrijednost ne može postići	I	A	jak
Svi pacijenti sa familijarnom hiperholesterolemijom se moraju prepoznati kao visokorizični pacijenti i liječiti sa terapijom za sniženje lipida	I	A	jak
Kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom, terapiju statinima u visokoj dozi treba započeti još dok je pacijent u bolnici	I	A	jak
Prevenција nehemoragijskog infarkta: mora se započeti terapija statinima kod svih pacijenata sa prisutnim arterosklerotskim oboljenjem i pacijenata sa visokim rizikom za pojavu KVB-a. Mora se započeti terapija statinima kod pacijenata koji su imali nekardioembolijski ishemijski infarkt	I	A	jak
Okluzivna arterijska bolest donjih ekstremiteta i bolest karotidnih arterija su ekvivalenti koronarne bolesti u smislu rizika, i preporučuje se terapija za sniženje lipida	I	A	jak
Statine treba preporučiti kao terapiju prvog izbora kod transplantiranih pacijenata sa dislipidemijom	I	A	jak
Hronična bolest bubrega (stadijum 2-5, GFR<90 ml/min/1,73m ²) je prepoznata kao ekvivalent koronarne bolesti u smislu rizika, i ciljnu vrijednost LDL kolesterola kod ovih pacijenata treba prilagoditi stepenu renalne insuficijencije	I	A	jak

Tabela br. 2. Preporuke Evropskog udruženja kardiologa za prevenciju KVB-a koje se odnose na lipide kao faktor rizika JTF5 - 2012

Preporuke za prevenciju KVB-a kod oboljelih od diabetes mellitusa su strožije u odnosu na opštu populaciju i oni predstavljaju visokorizične osobe za pojavu kardiovaskularnog

dogadjaja (2,21,34). Predložene preporuke ESC-a za prevenciju kod ovih bolesnika predstavljene su u tabeli br. 3.

Preporuke	Klasa	Nivo	Stepen
Ciljna vrijednost HbA1c za prevenciju KVB u dijabetesu je <7,0%	I	A	jak
Statini se preporučuju za smanjenje KVB rizika u dijabetesu	I	A	jak
Hipoglikemija i prekomjerna tjelesna težina se moraju otkloniti i individualni pristup (za ciljne vrijednosti i izbor lijekova) je neophodan kod pacijenata sa komplikacijama	I	B	jak
Metformin treba preporučiti kao terapiju prvog izbora, ukoliko se toleriše i nije kontraindikovano	IIa	B	jak
Dalje smanjenje HbA1c do ciljne vrijednosti <6,5% (najniža moguća bezbjedna HbA1c) može biti korisno za dijagnostiku. Za pacijente sa dugotrajnim dijabetesom, ova ciljna vrijednost može smanjiti rizik mikrovaskularnih komplikacija	IIb	B	slab
Ciljna vrijednost za krvni pritisak u dijabetesu je <140/80mmHg	I	A	jak
Ciljna vrijednost za LDL kolesterol je <2,5 mmol/l; za pacijente bez aterosklerotske bolesti ukupni kolesterol može biti <4,5 mmol/l; preporučuje se niža ciljna vrijednost za LDL kolesterol <1,8 mmol/l (koristeći više doze statina) za pacijente sa vrlo visokim rizikom za KVB	IIb	B	slab
Antiagregaciona terapija aspirinom se ne preporučuje pacijentima sa dijabetesom koji nemaju kliničke dokaze aterosklerotskog oboljenja	III	A	jak

Tabela br. 3. Prevencija KVB-a kod oboljelih od diabetes mellitusa (JTF5-2012)

Arterijska hipertenzija (HTA) je od ranije poznata kao faktor rizika za pojavu KVB-a (koronarna bolest, CVI, periferna arterijska bolest), a osim toga i za pojavu srčane insuficijencije, renalne insuficijencije, atrijalne fibrilacije i smanjenje kognitivnih funkcija. Rizik za nastanak KVB-a progresivno raste od visine krvnog pritiska 120/80 mmHg. Drugi faktori rizika poput diabetes mellitusa i dislipidemije su češći kod hipertoničara i povećavaju rizik za KVB. Upravo odluka o terapiji HTA se donosi na osnovu procjene ukupnog rizika za pojavu KVB-a, a ne samo na osnovu izmjerenih vrijednosti krvnog pritiska, tabela br. 4. Postoji direktna povezanost sa tjelesnom težinom, redukcija tjelesne težine od 5 kg smanjuje krvni pritisak za 4,4/3,6 mmHg. Fizička aktivnost (trening) može redukovati krvni pritisak za 3,5/3,2 mmHg. Brojni nutritivni faktori djeluju na krvni pritisak, treba preporučiti ishranu

bogatu voćem, povrćem, mliječnim proizvodima sa niskim procentom masti, uz redukciju zasićenih masti i soli.

U terapiji se pored promjene stila života koriste još i lijekovi. Prema važećim preporukama za terapiju HTA postoji 5 grupa antihipertenziva prve linije: diuretici, ACE inhibitori, blokatori receptora za angiotenzin II, beta blokatori i kalcijumski antagonisti. Odabir određenog lijeka zavisi od ukupnog KVB rizika i komorbiditeta. Korist smanjenja krvnog pritiska i postizanja ciljnih vrijednosti je utvrđena za oba pola, čak i nakon 80. godine života, (2,35). Efikasna kontrola krvnog pritiska je mnogo važnija od izbora lijeka. Ciljne vrijednosti za dobru kontrolu arterijske hipertenzije prema JTF5 su < 140/90 mmHg, a ukoliko se radi o osobama sa diabetes mellitusom < 140/80 mmHg, mada u preporukama za tretman HTA iz 2007. ta vrijednost je bila još strožija 130/80 mmHg.

SCORE rizik za KVB	Normalan TA < 130/85	Visok normalan TA 130-139/85-89	I stepen HTA 140-159/90-99	II stepen HTA 160-179/100-109	III stepen HTA ≥ 180/110
Nizak < 1%	Promjena stila života	Promjena stila života	Promjena stila života	Ljekovi ako perzistira	Ljekovi
Umjeren 1-4%	Promjena stila života	Promjena stila života	+ razmotriti lijekove	Ljekovi ako perzistira	Ljekovi
Povišen 5-9%	Promjena stila života	+ razmotriti lijekove	+ razmotriti lijekove	Ljekovi	Ljekovi
Značajno povišen ≥ 10%	Promjena stila života	+ razmotriti lijekove	Ljekovi	Ljekovi	Ljekovi

Tabela br. 4. Preporuke za tretman HTA i prevenciju KVB-a (ESC 2007)

Na Evropskom kongresu kardiologa u Minhenu, septembar 2008. godine, objavljeni su rezultati EUROASPIRE III istraživanja, koje je imalo za cilj da procijeni način života, faktore rizika i način terapije osoba sa visokim rizikom za kardiovaskularna oboljenja. Studija je obuhvatila 2392 visokorizična pacijenta iz 12 zemalja Evrope i odnosi se na period od 2006. do 2007. godine. Rezultati su pokazali da se visokorizični pacijenti u primarnoj i sekundarnoj prevenciji ne tretiraju efikasno. Više od 80% njih nikada nije dobilo bilo kakav savjet o značaju sprovođenja zdravog načina života. Visokorizični pacijenti su definisani kao osobe mlađe od 80 godina, sa istorijom koronarne bolesti ili druge arterosklerotske bolesti, koje su započele terapiju sa jednim ili više lijekova iz grupe antihipertenziva, lijekova za smanjenje lipida u serumu i/ili lijekova za terapiju diabetes mellitusa. Kontrola krvnog pritiska, lipidemije i glikemije su potpuno neadekvatne i većina pacijenata ne postiže ciljne vrijednosti prema preporukama. Među visokorizičnim pacijentima, 16% su pušači i 90% njih nastavlja da puši. Oko 50% visokorizičnih pacijenata je gojazno. Skoro 80% ima arterijski krvni pritisak, trigliceride i LDL kolesterol iznad ciljnih vrijednosti po Evropskim preporukama. Među dijabetičarima samo 27% ima glikemiju našte u terapijskom opsegu, a 53% njih ima HbA1c u terapijskom opsegu. Kardioprotektivni lijekovi, uključujući i statine, se nedovoljno propisuju. Skoro 85% pacijenata želi da zna rizik za pojavu koronarne bolesti, ali nijesu zainteresovani da učestvuju u programu promjene stila života.

U zaključku EUROASPIRE III se ističe, da je stil života pacijenata sa koronarnom bolešću i dalje glavni razlog za brigu; bez promjene u prevalenci pušenja i arterijske hipertenzije, kao i nastavku neželjenih trendova (porasta) u prevalenci

gojaznosti i centralne gojaznosti. Još se prije 10 godina predviđalo da će broj oboljelih od koronarne bolesti u svijetu i dalje rasti, uglavnom na račun porasta broja gojaznih i broja oboljelih od diabetes mellitusa. I upravo EUROASPIRE III ističe porast prevalence diabetes mellitusa i lošu terapijsku kontrolu dijabetičara, 78% njih ima vrijednosti glikemije iznad terapijskog cilja. Nastavlja se poboljšanje u kontroli lipidemije sa povećanom upotrebom statina, ali ipak 42% visokorizičnih pacijenata ne dostiže ciljne vrijednosti za ukupni kolesterol (36). Upotreba statina je povećana i u EUROASPIRE III je iznosila 87% u odnosu na 57% u EUROASPIRE II (9). Nema promjene u kontroli arterijskog krvnog pritiska i pored povećane upotrebe antihipertenziva, čak 61% visokorizičnih pacijenata ne postiže ciljnu vrijednost krvnog pritiska. Što se tiče terapije, primijećena je povećana upotreba antiagregacionih lijekova, beta blokatora, ACE inhibitora, blokatora receptora za angiotenzin II i diuretika, uz nižu upotrebu kalcijumskih antagonista u odnosu na EUROASPIRE II koja se odnosi na period od 1999. do 2000. godine.

Rezultati EUROASPIRE III ukazuju na bojazan da stanovništvo može izabrati radije da uzima tablete, nego da promijeni stil života. Zato se insistira na određivanju kardiovaskularnog rizika i promjeni stila života, jer multipli faktori rizika obično doprinose arterosklerozi koja uzrokuje KVB. Cilj treba da bude redukcija rizika za pojavu KVB-a. Ako cilj ne može biti postignut redukcijom jednog faktora rizika, rizik se još može smanjiti intenzivnijim djelovanjem na druge faktore rizika.

Uvijek treba imati na umu promjenu stila života i životnih navika bez kojih nema adekvatne prevencije KVB-a, bez obzira na primjenu različitih lijekova.

Literatura

1. -EUROASPIRE I and II Group. European Action on Secondary Prevention by Intervention to Reduce Events. Clinical reality of

coronary prevention programmes: a comparison of EUROASPIRE I and II in 9 countries. EUROASPIRE I and II Group. European Action on Secondary Prevention by Intervention to Reduce Events. *Lancet* 2001;357:995-1001.

2. European Guidelines on CVD Prevention - Forth Joint European Societies, Task Force on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. *Eur J CPR* 2007;2007(14) Preuzeto sa: www.escardio.org 09.

3. Leal J, Luengo-Fernandez R, Gray A, Petersen S, Rayner M. Economic burden of cardiovascular diseases in the enlarged European Union. *Eur Heart J* 2006;27:1610-9.

4. Sans S, Kesteloot H, Kromhout D. The burden of cardiovascular diseases mortality in Europe. Task Force of the European Society of Cardiology on Cardiovascular Mortality and Morbidity Statistics in Europe. *Eur Heart J* 1997;18(8) PubMed PMID: 9458415

5. -European Heart Network. European Cardiovascular Disease Statistics. edition. 2008.

6. European Guidelines on CVD Prevention in clinical practice (version 2012) – The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted of nine societies and by invited experts). *Eur Heart J* 2012;33:1635-1701.

7. Pyörälä K, Lehto S, de Bacquer D, de Sutter J, Sans S, Keil U, de Backer G. Risk factor management in diabetic and non-diabetic patients with coronary heart disease: Findings from the EUROASPIRE I AND II surveys. *Diabetologia* 2004;47(7):1257-65. PubMed PMID: 15235774

8. -National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final report. *Circulation* 2002;106(25):3143-421. PubMed PMID: 12485966

9. Peeters A, Mamun AA, Willekens F, Bonneux L. A cardiovascular life history. A life course analysis of the original Framingham Heart Study cohort. *European Heart Journal* 2002;23:458-466.

10. Reiner Z, Catapano AL, De BG, Graham I, Taskinen M, Wiklund O, Kjekshus J. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). *Eur Heart J* 2011;32(14):1769-818. PubMed PMID: 21712404

11. Conroy RM, Pyörälä K, Fitzgerald AP, Sans S, Menotti A, de Backer G, Graham IM. Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: The SCORE project. *Eur Heart J* 2003;24(11):987-1003. PubMed PMID: 12788299. doi: 10.1016/S0195-668X(03)00114-3

12. -Commission of the European Communities. Green paper. Promoting healthy diets and physical activity: a European dimension for the prevention of overweight, obesity and chronic diseases. *Int J Epidemiol*, COM. 2005;14(637)

13. Waters DD, Guyton JR, Herrington DM, McGowan MP, Wenger NK, Shear C. TNT Steering Committee Members and Investigators. Treating to New Targets (TNT) Study: does lowering low-density lipoprotein cholesterol levels below currently recommended guidelines yield incremental clinical benefit. *Am J Cardio* 2004;93:154-158.

14. Whitlock G, Lewington S, Sherliker P, Clarke R, Emberson J, Halsey J, Peto R. Body-mass index and cause-specific mortality in 900 000 adults: collaborative analyses of 57 prospective studies. *Lancet* 2009;373(9669):1083-96. PubMed PMID: 19299006. doi: 10.1016/S0140-6736(09)60318-4

15. de Gonzalez BA, Hartge P, Cerhan JR, Flint AJ, Hannan L, Macinnis RJ, et al. . Body-mass index and mortality among 1. 46 million white adults. *N Engl J Med*, 363. 2010. str. 2211-2219

16. Romero-Corral A, Montori VM, Somers VK, Korinek J, Thomas RJ, Allison TG, et al. . Association of bodyweight with total mortality and with cardiovascular events in coronary artery disease. *Lancet* 2006;368:666-678.

17. Lavie CJ, Milani RV, Ventura HO. Obesity and cardiovascular disease: risk factor, paradox, and impact of weight loss. *Journal of the American College of Cardiology* 2009;53(21):1925-32. PubMed PMID: 19460605. doi: 10.1016/j.jacc.2008.12.068

18. Goldberg RB, Mellies MJ, Sacks FM, Moye LA, Howard BV, Howard WJ, Braunwald E. Cardiovascular events and their reduction with pravastatin in diabetic and glucose-intolerant myocardial infarction survivors with average cholesterol levels: Subgroup analyses in the cholesterol and recurrent events (CARE) trial. The Care Investigat. *Circulation* 1998;98(23):2513-9. PubMed PMID: 9843456

19. -Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk individuals: A randomised placebo-controlled trial. *Lancet* 2002;360(9326) PubMed PMID: 12114036. doi: 10.1016/S0140-6736(02)09327-3

20. la Rosa JC, Grundy SM, Waters DD, Shear C, Barter P, Fruchart J, et al. . Intensive lipid lowering with atorvastatin in patients with stable coronary disease. *N Engl J Med* 2005;352(14) PubMed PMID: 15755765. doi: 10.1056/NEJMoa050461

21. Martin MJ, Hulley SB, Browner WS, Kuller LH, Wentworth DMR. MRFIT Study. *Lancet*, II 1986:933-936.

22. Pedersen TR, Wilhelmsen L, Olsson AG, Faergeman O, Strandberg T, Thorgeirsson G, et al. . Lipoprotein changes and reduction in the incidence of major coronary heart disease events in the Scandinavian Simvastatin Survival Study Group (4S). *Circulation*, 97. 1998. str. 1453-1460

23. Pitt B, Mancini GB, Ellis SG, Rosman HS, Park JS, McGovern ME. Pravastatin limitation of atherosclerosis in the coronary arteries (PLAC I): reduction in atherosclerosis progression and clinical events. PLAC I investigation. *J Am Coll Cardiol* 1995;26(5):1133-9. PubMed PMID: 7594023. doi: 10.1016/0735-1097(95)00301-0

24. Pitt B, Waters D, Brown WV, Boven AJ, Schwartz L, Title LM, McCormick LS. Aggressive lipid-lowering therapy

compared with angioplasty in stable coronary artery disease. Atorvastatin versus Revascularization Treatment Investigators. *N Engl J Med* 1999;341(2):70-6. PubMed PMID: 10395630

25. Ray KK, Cannon CP, McCabe CH, Cairns R, Tonkin AM, Sacks FM, Braunwald E. Early and late benefits of high-dose atorvastatin in patients with acute coronary syndromes: results from the PROVE IT-TIMI 22 trial. *J Am Coll Cardiol* 2005;46(8):1405-10. PubMed PMID: 16226162

26. Sever PS, Dahlof B, Poulter NR, Wedel H, Beevers G, Caulfield M, et al. . Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised controlled trial. *Lancet* 2003;361:1149-58.

27. Prueksaritanont T, Tang C, Qiu Y, Mu L, Subramanian R, Lin JH. Effects of fibrates on metabolism of statins in human hepatocytes. *Drug Metab Dispos* 2002;30(11):1280-7. PubMed PMID: 12386136. doi: 10.1124/dmd.30.11.1280

28. Shepherd J, Blauw GJ, Murphy MB, Bollen ELEM, Buckley BM, Cobbe SM, Hyland M. Pravastatin in elderly individuals at risk of vascular disease (PROSPER): A randomised controlled trial. *Lancet* 2002;360(9346):1623-30. PubMed PMID: 12457784. doi: 10.1016/S0140-6736(02)11600-X

29. Law MR, Wald NJ, Thompson SG. By how much and how quickly does reduction in serum cholesterol concentration lower risk of ischaemic heart disease. *BMJ* 1994;308(6925):367-72. PubMed PMID: 8043072

30. Assmann G, Schulte H. The Prospective Cardiovascular Münster (PROCAM) study: Prevalence of hyperlipidemia in persons with hypertension and/or diabetes mellitus and the relationship to coronary heart disease. *Am Heart J* 1988;116(6 Pt 2):1713-24. PubMed PMID: 3202078. doi: 10.1016/0002-8703(88)90220-7

31. Dean BB, Borenstein JE, Henning JM, Knight K, Merz NBC. Can change in high-density lipoprotein cholesterol levels reduce cardiovascular risk. *Am Heart J* 2004;147(6):966-76. PubMed PMID: 15199342

32. Ryden L, Standy E, Bartnik M, van den Berghe G, Betteridge J, de Jan BM, et al. . Task Force on Diabetes and Cardiovascular Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and European Association for the Study of Diabetes (EASD). Guidelines on diabetes pre-diabetes and cardiovascular diseases: executive summary. Task Force on Diabetes and Cardiovascular Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and European Association for the Study of Diabetes (EASD). *Eur Heart J* 2007;28:88-136.

33. Mancia G, de Backer G, Dominiczak A, Cifkova R, Fagard R, Germano G, et al. . 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). *Journal of hypertension* 2007;25(6):1105-87. PubMed PMID: 17563527. doi: 10.1097/HJH.0b013e3281fc975a

34. Kotseva K, Wood D, De BG, De BD, Pyörälä K, Reiner Z, Keil U. EUROASPIRE III. Management of cardiovascular risk factors in asymptomatic high-risk patients in general practice: cross-sectional survey in 12 European countries. *Eur J Cardiovasc Prev Rehabil* 2010;17(5):530-40. PubMed PMID: 20577089